

II.A.42

Analysis

Die Exponentialfunktion und die Temperatur von Getränken – Tee zu kalt, Cola zu warm?

Ein Beitrag von Prof. Dr. Andreas Pfeifer



© kajakki/E+

Es gibt nichts Besseres als ein eisgekühltes Getränk im Sommer und den heißen Aufwärmtee im Winter. Doch was für eine Mathematik steckt eigentlich dahinter, wenn dieses Getränk immer mehr die Umgebungstemperatur annimmt? Dieser Frage können die Lernenden mithilfe dieses Beitrags ausführlich auf den Grund gehen. Inhand von Messdaten wird der Zusammenhang zwischen Zeit und Temperatur von Getränken untersucht. Dabei werden mithilfe konkreter Anwendung der Tee- und Cola-Temperatur verschiedene Funktionstypen wie Polynome, Hyperbel, Exponentialfunktionen untersucht. Rechenregeln für Logarithme, Potenz- und Exponentialrechnung und auch Lösungsmethoden von Gleichungen werden umfangreich eingeübt.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe: 10/11

Dauer: 4 Unterrichtsstunden (Minimalplan 2 Unterrichtsstunden)

Inhalt: Funktionsbegriff, verschiedene Funktionstypen vergleichen, Exponentialfunktion, Rechenregeln, Termumformungen

Kompetenzen: mathematisch modellieren (K3), mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen (K5)

Zusatzmaterialien: *Excel-Datei*

Auf einen Blick

Ab: Arbeitsblatt

Planung für 4 Stunden: **M 1** und **M 2** insgesamt 2 Stunden, **M 3** und **M 4** jeweils eine Stunde

Einstieg

Thema: Problemorientierter Unterrichtseinstieg
M 1 (Ab) Zusammenhang zwischen Zeit und Temperatur

Erarbeitung

Thema: Berechnen und Interpretieren
M 2 (Ab) Analyse dreier Temperaturfunktionen
Benötigt: Taschenrechner
M 3 (Ab) Eigenschaften der Temperaturfunktion und ihrer Umkehrfunktion

Übung bzw. Hausaufgabe

Thema: Anwendung auf ein Kaltgetränk
M 4 (Ab) Temperaturverlauf eines Kaltgetränks
Benötigt: Taschenrechner

Lösung

Die **Lösungen** zu den Materialien finden Sie ab Seite 11.

Minimalplan

Die Zeit ist knapp? Dann können Sie die Unterrichtseinheit für zwei Stunden mit den folgenden Materialien durchführen:

M 1 (Ab) Zusammenhang zwischen Zeit und Temperatur
M 2 (Ab) Analyse dreier Temperaturfunktionen. (Aus Zeitgründen kann auch nur eine Funktion verwendet werden.)

M 1

Einstieg: Zusammenhang zwischen Zeit und Temperatur

Svenja bekommt eine Tasse ziemlich heißen Tee. Da er ihr zum Trinken zu heiß ist, wartet sie ab und misst erst mal die Temperatur nach einer Minute und nach sechs Minuten. Die gemessenen Werte sind in der folgenden Tabelle angegeben: Bekannt ist außerdem die Raumtemperatur (Umgebungstemperatur) von $21\text{ }^{\circ}\text{C}$.


Messwert k	1	2
Zeit in Minuten t_k	1	6
Temperatur T_k in Grad Celsius ($^{\circ}\text{C}$)	72	55

Aufgabe

Svenja will den Tee nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt trinken. Deshalb will die Temperatur des Tees eine bestimmte Temperatur haben. Sie will wissen, wann diese Temperatur erreicht ist. Können Sie ihr helfen?

Gesucht ist eine Funktionsvorschrift $T(t)$, mit der bei gegebener Zeit t die Temperatur $T(t)$ ermittelt werden kann.

- a) **Tragen** Sie dazu die beiden Messpunkte in das nachfolgende Koordinatensystem ein.



- b) Überlegen Sie, welche Eigenschaften die Temperaturfunktion noch hat, außer dass sie durch die beiden Messpunkte gehen sollte. **Geben** Sie mindestens zwei Eigenschaften an.

- c) **Untersuchen** Sie die folgenden Funktionstypen, ob sie für den Temperaturverlauf in Frage kommen. Dabei sind a, b bzw. c reelle Zahlen. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit der Kombination der einzelnen Funktionstypen. Diese aufwändigeren Funktionen sollen aber nicht betrachtet werden.

Funktionstyp	Funktionstyp sinnvoll? Begründen Sie Ihre Antwort.
Konstante Funktion $T(t) = a$	
Gerade $T(t) = m t + b$	
Parabel $T(t) = a t^2 + b t + c$	
Hyperbel Ausdrücke mit z. B. $T(t) = \frac{1}{t}$ $T(t) = \frac{1}{t^2}$ $T(t) = \frac{a}{t+b} + c$ $T(t) = \frac{1}{at+b} + c$	
Exponentialfunktion $T(t) = a \cdot b^t$ $T(t) = a \cdot b^t + c$	
Trigonometrische Funktion Ausdrücke mit $\sin(t)$, $\cos(t)$	
Logarithmusfunktion $T(t) = a \ln(bt) + c$	
Wurzelfunktion $T(t) = \sqrt{t}$	

- d) Für welche(n) Funktionstyp(en) entscheiden Sie sich? Warum? **Erläutern** Sie.

M 2



Erarbeitung: Analyse dreier Temperaturfunktionen

Sie bekommen eine Tasse ziemlich heißen Tee. Da er zu heiß zum Trinken ist, messen Sie zunächst die Temperatur. Die gemessenen Werte sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Messwert k	1	
Zeit in Minuten t_k	1	6
Temperatur T_k in Grad Celsius ($^{\circ}\text{C}$)	72	65

Bekannt ist außerdem die Raumtemperatur (Umgebungstemperatur) von 21°C .

Es bieten sich die folgenden Funktionstypen für den Temperaturverlauf an:

$$T_{\text{hyp1}}(t) = \frac{a}{t} + \frac{b}{t^2} + c, \quad T_{\text{hyp2}}(t) = \frac{1}{at+b} + c \quad \text{und} \quad T_{\text{exp}}(t) = a \cdot b^t + c.$$

Aufgabe

- Ermitteln** Sie für jede Funktion eine Vorhersage für die Temperatur nach 15 Minuten.
- Zeichnen** Sie den Temperaturverlauf bei den drei Funktionstypen in das Koordinatensystem ein.
- Welche der Funktionstypen ist die bessere bzw. geeignete? **Burteilen** Sie.




Tip

Berechnen Sie zuerst für die drei Funktionstypen die Koeffizienten a und b, sodass die jeweilige Funktion die angegebenen Datenwerte erfüllt. Tragen Sie die gefundenen Funktionen ein:

$$T_{\text{hyp1}}(t) = \underline{\hspace{2cm}} \quad T_{\text{hyp2}}(t) = \underline{\hspace{2cm}} \quad T_{\text{exp}}(t) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Wertetabelle

Zeit t	1												
T_{hyp1}	72,0												
T_{hyp2}	72,0												
T_{exp}	72,0												



Sie wollen mehr für Ihr Fach? Bekommen Sie: Ganz einfach zum Download im RAABE Webshop.



Über 5.000 Unterrichtseinheiten
sofort zum Download verfügbar



Webinare und Videos
für Ihre fachliche und
persönliche Weiterbildung



Attraktive Vergünstigungen
für Referendar:innen mit
bis zu 15% Rabatt



Käuferschutz
mit Trusted Shops



Jetzt entdecken:
www.raabe.de